

## LONG



住化積水フィルム株式会社



## 場がリノロング


- |波長380nm以下の紫外線領域をカット!! 紫外線カットの効果が長期間持続します。 作物の生長促進に効果があります。
- 高保温を実現します!! 独自の配合技術により、一般農ビと変らない保温力を発揮します。
- 長期展張が可能です!! セキスイの特殊配合技術により、耐久性はバツグンです。
- 害虫の侵入を抑制します!! 害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。
- |八ウス資材の劣化防止!! ハウス内の資材の耐候劣化を抑制し長期間 にわたってその効果が継続されます。

ピーマン、キュウリ、 軟弱野菜など






UV持続率ですが、5年経ってもほとんど変わらないので初期状態のデータのみになります。



カット率は強靭との比較になります。



標準規格サイズ	厚さ(mm)	幅 (cm)	長さ (m)
	0.15	135 • 150 • 185 • 200 • 230 • 270 • 300 • 330 • 370 • 400 • 460 • 500 • 540 600 • 630 • 660 • 700 • 740 • 770 • 800 • 840 • 900 • 960 • 1000	加工品対応 (m単位)

(規格外サイズにつきましては営業にご相談ください)

- 1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読める ように展張してください。
- 2. ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとのコスレに ご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 3. 高温時にフィルムどうしが融着することがありますので、フィルムを保管する時には 直射日光のあたらない冷暗所において、展張途中や保管には十分ご注意ください。
- 4. 夏場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に 展張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
- 5. ハウス内で硫黄クン蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご 注意ください。
- 6. 濡れたままの状態で巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございます ので、よく乾燥させてから保管してください。
- 農ビ用ハウスバンド。を使用しますと破れることがありますので、ご注意ください。また、 スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 8. 農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。
- 9. 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
- 「花野果UVロング」はナス、花の一部やミツバチを用いた栽培法には適さない場合があり
- 11. 殺虫や殺菌の効果はありません。発生に応じた適切な防除が必要です。

## 住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県百理郡百理町逢隈高屋字棚子1-1

TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826 関東営業グループ

〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル4F)

TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021

関西営業グループ 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル5F) TEL. 06-6365-4226 FAX. 06-6365-4227

九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地 TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111

http://www.ss-film.co.jp/

西日本営業部

取扱店			